

WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ



Ciech
Sarżyna




www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

CIECH Sarżyna S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarżyna, tel. (17) 24 07 111


PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ



BBCH

CHWASTOX

TURBO® 340 SL



WSZECHSTRONNY
SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW

BEZPIECZNY
DLA ROŚLINY UPRAWNEJ I UPRAW NASTĘPCZYCH

SKUTECZNY
W ZWALCZANIU PRZYTULII CZEPNEJ I KOMOSY BIAŁEJ

UNIWESALNY
MOŻE BYĆ STOSOWANY WE WSZYSTKICH GATUNKACH ZBÓŻ

FENUXAR®

69 EW






SKUTECZNY
W ZWALCZANIU UCIAŻLIWYCH CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W UPRAWIE ZBÓŻ

UNIWERSALNY
SZEROKIE OKNO APLIKACJI W ZBOŻACH OZIMYCH I JARYCH

SKUTECZNY
W MIESZANINIE OPRYSKOWEJ Z CHWASTOX TURBO® 340 SL, CO ZOSTAŁO POTWIERDZONE REJESTRACYJNIE



Dostępny w pakiecie z CHWASTOX TURBO®

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 JĘCZMIEN JARY, OWIES, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia	2,0 l/ha	21 – 29 od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, JĘCZMIEN OZIMY		2,5 l/ha	

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME	gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	1,0-1,2 l/ha	22 – 33 na wiosnę, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia, do końca fazy 3. kolanka
 JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	FENUXAR® 69 EW 1,0 l/ha + CHWASTOX TURBO® 340 SL 2,0 l/ha	20 – 31 od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka

CHWASTOX

EXTRA[®] 300 SL



MCPA
300 g/l

PROFESJONALNY
STWORZONY DO ZWALCZANIA KOMOSY
I INNYCH CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

MIESZALNY
DOSKONAŁY KOMPONENTEM
DO MIESZANIN ZBIORNIKOWYCH

PRECYZYJNY
JAKO NARZĘDZIE DO ZABIEGÓW
KOREKCYJNYCH

CHWASTOX[®]

NOWY TRIO 390 SL







MCPA
200 g/l
MEKOPROP-P
150 g/l
DIKAMBA
40 g/l

WSZECHSTRONNY
SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHWASTÓW

EKSPRESOWY
WYKAZUJE SZYBKĄ
EFEKT CHWASTOBÓJCZY

KOMPLEKSOWY
UNIERSALNE ROZWIĄZANIE
DO WALKI Z CHWASTAMI

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA JARA, JĘCZMIEN JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES, PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO	dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, ostróżeczka polna, poziomnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny	3,0 l/ha	21 – 29 od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, JĘCZMIEN OZIMY	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozlogowwy, koniczyzna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępowka zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny	2,0 l/ha	21 – 29 od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca
 PSZENICA JARA, JĘCZMIEN JARY, OWIES, PSZENŻYTO JARE	gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, rumian polny, dymnica pospolita, szarłat szorstki, poziomnik szorstki	1,5 l/ha	

TOKAMA®



NOWOŚĆ



PROTIKONAZOL
125 g/l
TEBUKONAZOL
125 g/l

SKUTECZNY
ZWALCZA I CHRONI ZBOŻA PRZED
CHOROBYMI GRZYBOWYMI

KOMPLETNY
NIE WYMAGA STOSOWANIA
INNYCH PRODUKTÓW

ELASTYCZNY
DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH
ZBOŻACH OZIMYCH I JARYCH
W SZEROKIM OKNIE APLIKACYJNYM



TARCZA® ŁAN

EXTRA 250 EW



TEBUKONAZOL
250 g/l

SKUTECZNY
DZIĘKI ODPOWIEDNIM KOFORMULANTOM
BARDZO DOBRZE DZIAŁA NAWET
W NISZEJ DAWCE

KOOPERATYWNY
Z MIESZANINAMI OPRYSKOWYMI,
CO ROZSZERZA SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHOROBY I WPROWADZA KOLEJNE
MECHANIZMY DZIAŁANIA

ELASTYCZNY
MA SZEROKIE OKNO APLIKACJI, CO
UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE WSZYSTKICH
WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI AKTYWNEJ




UPRAWA	SPEKTRUM CHOROBY		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ JARY, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści*	0,75-1,0 l/ha	30 – 59 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

UPRAWA	SPEKTRUM CHOROBY		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA	brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy	0,75-1,25 l/ha	30 – 59 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

PRODUKT TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ DO JESIENNEGO I WIOSENNEGO STOSOWANIA W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO

AZOKSAR[®]

SUPER 250 SC





- UNIWERSALNY**
ZAREJESTROWANY W KILKUDZIESIECIU UPRAWACH POLOWYCH I MAŁOOBSZAROWYCH
- WIELOKIERUNKOWY**
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH PROGRAMACH OCHRONY
- EKONOMICZNY**
EFEKTYWNY I SKUTECZNY W DZIAŁANIU

MICOSAR[®]




60 SL



- WIELOKIERUNKOWY**
DZIAŁA SYSTEMICZNIE; DO STOSOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO, INTERWENCYJNEGO I WYNISZCZAJĄCEGO
- EFEKTYWNY**
REGULUJE POKRÓJ RZEPAKU I UTRZYMUJE JEGO ZDROWOTNOŚĆ
- NIEZAWODNY**
ZWALCZA NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY PSZENICY I RZEPAKU OZIMEGO

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów	 0,8 l/ha 30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
JĘCZMIENŃ OZIMY, JĘCZMIENŃ JARY	rnychosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)	
PSZENŻYTO OZIME	septorioza plew, rdza brunatna	
ŻYTO OZIME	rdza brunatna żyta, rnychosporioza zbóż	

AZOKASAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH: RZEPAK OZIMY, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELE INNYCH

UPRAWA	SPEKTRUM CHORÓB	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA	septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów	 1,2-1,5 l/ha 30 – 59 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
 PSZENICA JARA	fuzarioza kłosów	


MICOSAR[®] 60 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ DO JESIENNEGO I WIOSENNEGO STOSOWANIA W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO

LEPTOSAR®

200 SL



NOWOŚĆ




- **SKUTECZNY**
NIEZAWODNIE CHRONI PLANTACJE
W OKRESIE WEGETACYJNYM
- **UNIWERSALNY**
SZEROKA REJESTRACJA
W BLISKO 50. UPRAWACH
- **KOMPLEKSOWY**
ZWALCZA SZKODNIKI W RÓŻNYCH
STADIACH ROZWOJOWYCH

TOSCANA®

TOP 75 WG




NOWOŚĆ






**TRIBENURON
METYLU**
750 g/kg

- **SKUTECZNA**
ZWALCZA TRUDNE CHWASTY
W UPRAWIE ZBÓŻ
- **ELASTYCZNA**
SZEROKIE OKNO APLIKACYJNE -
MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA WIOSNĄ
I JESIENIĄ
- **UNIWERSALNA**
DO STOSOWANIA W WIĘKSZOŚCI
ZBÓŻ OZIMYCH I JARYCH

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
ŻYTO JARE, PSZENICA TWARDA, PSZENICA ORKISZ, PSZENICA SAMOPSHA, PSZENICA PŁASKURKA	zółwinek zbożowy	0,2 l/ha	30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia
	skrzypionka zbożowa		37 – 65 od fazy widocznego, ale jeszcze nierozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia
PSZENICA JARA, PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO JARE, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME	zółwinek zbożowy		30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH KUKURYDZY,
RZEPAKU, UPRAWACH WARZYWNICZYCH ORAZ SADOWNICZYCH

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna	0,02 kg/ha	13 – 29 jesienią od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia
 JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE		0,025 kg/ha	13 – 39 wiosną od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego

WINDSAR®

250 EC



TRINEKSAPAK
ETYLU
250 g/l



UNIWERSALNY

ZAREJESTROWANY WE WSZYSTKICH ZBOŻACH OZIMYCH I JARYCH, RZEPAKU OZIMYM ORAZ WIELU UPRAWACH MAŁOBSZAROWYCH

ELASTYCZNY W STOSOWANIU

MA DŁUGI OKRES APLIKACJI

EKONOMICZNY

UŁATWIA ZBIÓR I OGRANICZA STRATY PLONU; ZAPOBIEGA WYLEGANIU

HALVETIC®



EFEKTYWNY

WYKAŻUJE WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ NIESELEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHWASTÓW

GOTOWY DO UŻYCIA

STOSOWANY BEZ DODATKÓW USZLACHTNIAJĄCYCH CIECZ ROBOCZĄ

NIEZAWODNY

DZIAŁA RÓWNIŻ W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH POGODOWYCH

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN JARY, OWIES SIEWNY, PSZENICA JARA	regulacja wzrostu i rozwoju roślin, skrócenie i usztywnienie źdźbła zbóż – zapobieganie wyleganiu łanu	0,4 - 0,6 l/ha*	25 - 39* od fazy pełni krzewienia do fazy liścia fagowego*

* w zależności od uprawy

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH – ŚCIERNISKA	bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, psianka czarna, samosiewy zbóż, stąrzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzciniak piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa, babka lancetowata	2,5-4,0 l/ha	po zbiorze roślin uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty


WINDSAR® 250 EC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH RZEPAKU, A TAKŻE PLANTACJI NASIENNYCH: TRAW I KONICZYNY CZERWONEJ

HALVETIC® ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIŻ W UPRAWACH SADOWNICZYCH, KUKURYDZY, TERENACH NIEUŻYTKOWANYCH ROLNICZO ORAZ UPRAWACH WARZYWNICZYCH

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA I DAWKOWANIA PRODUKTÓW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. (17) 24 07 503
sprzedaz.sarzyna@ciechgroup.com

PRZEJDŹ DO STRONY
WWW.CIECHAGRO.PL



ZESKANUJ KOD QR
i porozmawiaj
z przedstawicielem
działającym na terenie
Twojego regionu



CIECH Sarzyna S.A.
ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 17 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

Śledź nas na:



www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.