

AKAPIT®

125 EC

Forma użytkowa **AKAPIT® 125 EC** została bardzo dobrze dopracowana pod kątem wykorzystania odpowiednich koformulantów, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej skuteczności produktu przy zastosowaniu mniejszej ilości substancji aktywnej w porównaniu z produktami o większej zawartości substancji aktywnej fluazifopu-P-butyli w litrze produktu.

STOSUJ
W ZAKRESIE DAWEK:
1,0 - 3,0 l/ha

FLUAZIFOP-P-
BUTYLU
125 g/l



ELASTYCZNIE ROZWIĄZANIE –
WIELE UPRAW I SZEROKIE
SPEKTRUM ZWALCZANYCH
CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH

EKONOMICZNY W STOSOWANIU –
MOŻLIWOŚĆ DOBORU DAWKI
DO ZWALCZANEGO CHWASTU

POTWIERDZONA WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ PRZY
ZRÓŻNICOWANEJ DAWCE
WODY 150-300 l/ha

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA:



SAMOSIEWY ZBÓŻ
...



CHWASTNICA JEDNOSTRONNA
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI
...



WYCZYNIEC POLNY
ALOPECURUS MYOSUROIDES
...



PALUSZNIK KRWAWY
DIGITARIA SANGUINALIS
...



MIOTŁA ZBOŻOWA
APERA SPICA VENTI
...



OWIES GŁUCHY
AVENA FATUA
...



WIECHLINA ZWYCZAJNA
POA TRIVIALIS
...



WŁOŚNICA SINA
SETARIA GLAUCA
...



WŁOŚNICA ZIELONA
SETARIA VIRIDIS
...



PERZ WŁAŚCIWY
ELYMUS REPENS
...



ŻYCICA TRWAŁA
LOLIUM PERENNE
...

chwasty wrażliwe ...

UPRAWA	DAWKA [L/HA]	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
Rzepak ozimy	1,0-3,0	1	BBCH 12-18 ; jesienią od 2 do 8 liści
Fasola szparagowa			BBCH do 35 ; wiosną od ruszenia vegetacji do fazy 5-ego międzywęzła
Truskawka			Fasola:BBCH 11 -51 ; Truskawka: po zbiorze BBCH >90
Ziemniak	1,0-2,0		BBCH12-40, od fazy 2-go liścia do początku fazy zawiązywania bulw, przed zakryciem międzyrzędzi

INFORMACJE PODSTAWOWE	
Forma użytkowa:	EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Zawartość substancji aktywnych:	Fluazifop-P-butyli 125 g/l
Mechanizm działania wg HRAC:	A – inhibitor enzymu ACCazy
Sposób pobierania:	Przez liście
Sposób działania:	Systemiczny