

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ



Śledź nas na:



www.qemetica-agro.pl

Better Farming
Better Future

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland



Spis treści

Herbicydy

HALVETIC®	2
CHWASTOX TURBO® 340 SL	3
FENUXAR® 69 EW	4
FAWORYT® 300 SL	5
TOSCANA® TOP 75 WG	6

Fungicydy

TOKAMA®	7
AZOKSAR® SUPER 250 SC	8

Regulatory wzrostu

WINDSAR® 250 EC	9
-----------------------	---

Insektycydy

LEPTOSAR® 200 SL	10
------------------------	----

Programy ochrony zbóż

Pełna ochrona T1-T2-T3	11
Podstawowa ochrona T1-T2	13





Idealnie dostosowany
na potrzeby Systemów
Zrównoważonego Rolnictwa
(uprawa uproszczona lub
konserwująca)

Łatwy w użyciu dzięki
wbudowanemu systemowi
adiuwantów, zapewniający
pełną kontrolę nad
chwastami

Brak ograniczeń
w doborze upraw
następujących




Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L, 1000L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH – ŚCIERNISKA	bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlinia roczna, żóttlica drobnokwiatowa, babka lancetowata	 2,5-4,0 l/ha	po zbiorze roślin uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

HALVETIC® ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W KUKURYDZY, W UPRAWACH SADOWNICZYCH, WARZYWNYCH ORAZ TERENACH NIEUŻYTKOWANYCH ROLNICZO

CHWASTOX

TURBO® 340 SL



WSZECHSTRONNY

szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych w tym przytulii czepnej i komosy białej

BEZPIECZNY

dla rośliny uprawnej i upraw następnych

SKUTECZNY

niezbędny element strategii antyodpornościowej chwastów dwuliściennych

UNIWERSALNY


może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 JĘCZMIEN JARY, OWIES, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia	2,0 l/ha	21 – 29 od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, JĘCZMIEN OZIMY		2,5 l/ha	

FENUXAR®

69 EW



FENOKSAPROP-
-P-ETYLU
69 g/l



Dostępny w paczce
z CHWASTOX
TURBO®



SKUTECZNY

w zwalczaniu uciążliwych chwastów
jednoliściennych w uprawie zbóż

UNIWERSALNY

szerokie okno aplikacji w zbożach
ozimych i jarych

KOMPATYBILNY

z CHWASTOX TURBO 340 SL

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWA- NIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME	gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	1,0-1,2 l/ha	22 – 33 na wiosnę, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia, do końca fazy 3. kolanka
 JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA	chwałstnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	FENUXAR® 69 EW 1,0 l/ha + CHWASTOX TURBO® 340 SL 2,0 l/ha	20 – 31 od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka

FAWORYT®

300 SL



BEZKONKURENCYJNIE

zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwonną

BEZWZGLĘDNIE

niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety

SKUTECZNIE

zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów

WYGODNY

gdyż jest świetnym uzupełnieniem ochrony herbicydowej oraz komponentem do mieszanin opryskowych

BEZPIECZNY


dla upraw następczych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250 ml, 1L, 5L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA	 0,3-0,4 l/ha	1	21-29 Wiosną w fazie krzewienia pszenicy

TOSCANA[®]

TOP 75 WG



SKUTECZNA

zwalcza trudne chwasty
w uprawie zbóż

ELASTYCZNA

szerokie okno aplikacji.
Możliwość zastosowania wiosną
lub jesienią.

UNIWERSALNA

zastosowanie w zbożach ozimych
i jarych

Dostępny w opakowaniach: 20g, 100g, 250g

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna	 0,02 kg/ha	13 – 29 jesienią od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia
		0,025 kg/ha	
 JEĆZMIEN JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE		0,02 kg/ha	13 – 39 wiosną od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego

TOKAMA[®]



PROTIKONAZOL
125 g/l
TEBUKONAZOL
125 g/l



SKUTECZNY

zwalcza i chroni zboża przed chorobami grzybowymi

KOMPLETNY

nie wymaga stosowania innych produktów

ELASTYCZNY


do zastosowania we wszystkich zbożach ozimych i jarych, szerokie okno aplikacji

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEN JARY, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści*	0,75-1,0 l/ha	30 – 59 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

AZOKSAR[®]

SUPER 250 SC



UNIWERSALNY

szeroka rejestracja w uprawach polowych pod osłoną oraz małoobszarowych

WIELOKIERUNKOWY

doskonały partner w różnych programach ochrony

EKONOMICZNY

efektywny i skuteczny w działaniu

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROŚ	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów	 0,8 l/ha 30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY	rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)	
PSZENŻYTO OZIME	septorioza plew, rdza brunatna	
ŻYTO OZIME	rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż	

AZOKASAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH: RZEPAK OZIMY, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

WINDSAR®

250 EC



UNIWERSALNY

zarejestrowany w zbożach i rzepaku. Rozszerzona rejestracja o plantacje traw nasiennych i koniczyny czerwonej

ELASTYCZNY

szerokie okno aplikacji

EKONOMICZNY

ułatwia zbiór i ogranicza straty plonu; zapobiega wyleganiu

Dostępny w opakowaniach 1L, 5L


UPRAWA	DZIAŁANIE		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN JARY, OWIES SIEWNY, PSZENICA JARA	regulacja wzrostu i rozwoju roślin, skrócenie i usztywnienie źdźbła zbóż – zapobieganie wyleganiu tanu	 0,4 - 0,6 l/ha*	25 – 39* od fazy pełni krzewienia do fazy liścia fagowego*

* w zależności od uprawy

WINDSAR® 250 EC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH RZEPAKU, A TAKŻE PLANTACJACH NASIENNYCH: TRAW I KONICZYNY CZERWONEJ

LEPTOSAR®

200 SL



SKUTECZNY

szkodniki przestają żerować tuż po zastosowaniu chroniąc roślinę przez wiele dni

UNIERSALNY

szeroka rejestracja w 50 uprawach: polowych, pod osłonami i małoobszarowych. Krótki okres karencji

KOMPLEKSOWY

zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych, zapewnia **EFEKT LONG ACTION+**

Dostępny w opakowaniach 250 ml, 1L, 5L

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
ŻYTO JARE, PSZENICA TWARDA, PSZENICA ORKISZ, PSZENICA SAMOPSA, PSZENICA PŁASKURKA	żółwinek zbożowy	 0,2 l/ha	30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia
	skrzypionka zbożowa		37 – 65 od fazy widocznego, ale jeszcze nierozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia
PSZENICA JARA, PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO JARE, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME	żółwinek zbożowy		30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH KUKURYDZY, RZEPAKU, WARZYSKACH I SADACH

PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ - OPTYMALNY

ZAPRAWA
SARFUN®
025 FS
00

KRUM®
800
00 13

HUKKATA®
500 SC
00

CHWASTOX®
DUO BOX

21 29

FAWORYT
300 SL
21 29

TOSCANA®
TOP 75 WG
13

T1


WINDSAR®
250 EC
29 30 31

TOKAMA®
30

LEPTOSAR®
200 SL
30

BBCH





PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ - PODSTAWOWY

ZAPRAWA
SARFUN®
025 FS
00

T1
WINDSAR®
250 EC
29 30 31

KRUM®
800
00 13

LUB
CHWASTOX®
DUO BOX

TOKAMA®
30

HUKKATA®
500 SC
00 21 29


FAWORYT
300 SL
21 29

LEPTOSAR®
200 SL
30

TOSCANA®
TOP 75 WG
13

BBCH





Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego areалу



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym