

NIEZAWODNA OCHRONA KUKURYDZY



Śledź nas na:

www.qemetica-agro.pl



Better Farming
Better Future

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

NIEZAWODNA OCHRONA KUKURYDZY



Spis treści

Środki ochrony kukurydzy

PROGRAM „CZYSTY START”	2
HALVETIC®	3
TEZOSAR® EXTRA BOX	4
TEZOSAR® 500 SC	5
NIKOSAR® 060 OD	6
JUZAN® EXTRA 100 SC	7
LEPTOSAR® 200 SL	8

Program ochrony kukurydzy ... 9



PROGRAM „CZYSTY START”

**Kompleksowa ochrona kukurydzy
przy użyciu HALVETIC®
oraz TEZOSAR® EXTRA BOX**

- w terminie przedwiosnowym zastosowanie Halvetic® zapewnia ochronę przed chwastami jedno i dwuliściennymi,
- w terminie powschodowym TEZOSAR® EXTRA BOX chroni plantację kukurydzy nawet do 6 tygodni.



DAWKOWANIE:

HALVETIC® [1,5 - 3,0 l/ha]

TEZOSAR® EXTRA BOX:

- **NIKOSAR® 060 OD** [0,7 l/ha]
- **TEZOSAR® 500 SC** [1,0 l/ha]
- **JUZAN® EXTRA 100 SC** [1 l/ha]

Zaawansowana formuła inteligentne działanie

Idealnie dostosowany na potrzeby Systemów Zrównoważonego Rolnictwa (**uprawa uproszczona** lub konserwująca)

Łatwy w użyciu dzięki **wbudowanemu systemowi adiuwantów**, zapewniający pełną kontrolę nad chwastami

Brak ograniczeń w doborze upraw następnych



DAWKOWANIE

1,5 - 3,0 l/ha

przedwschodowo

Technologia BGT zapewnia dwa razy większą wydajność produktu - potwierdzono na podstawie badań rejestracyjnych względem standardowych produktów dostępnych w sprzedaży.

TEZOSAR®

EXTRA BOX

PAKIET GOTOWY NA WSZYSTKO

Dostępne opakowania:
3x1L, 3x5L,
3x10L



Gotowe rozwiązanie do skutecznej ochrony herbicydowej kukurydzy

- **Szerokie spektrum** zwalczanych chwastów
- **Połączenie bardzo dobrego działania** odlegowego z nalistnym. Ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym do 6 tygodni od wykonania zabiegu
- Aplikacja nalistna możliwa **nawet w fazie 6-go liścia (BBCH 16)**

Zwalczane chwasty

Chwastnica jednostronna

Fiołek polny

Gwiazdnica pospolita

Jasnota purpurowa

Komosa biała

Maruna bezwonna

Przetacznik polny

Przytulia czepna

Psianka czarna

Rdestówka powojowata

Samosiewy rzepaku

Szarłat szorstki

Tasznik pospolity

Tobołki polne

Perz właściwy

TEZOSAR®

500 SC

SOLIDNY FUNDAMENT TO PODSTAWA



TERBUTYLAZYNA
500g/l



SKUTECZNY

chroni plantację w czasie intensywnych wschodów chwastów nawet do 8 tygodni

PODWÓJNA SIŁA DZIAŁANIA

pobierany przez korzenie i częściowo przez liście błyskawicznie zwalcza chwasty


BEZKONKURENCYJNY

zwalcza uciążliwe chwasty o mocnym systemie korzeniowym

NIKOSAR®

060 OD

TO TWOJE ZWYCIĘSTWO



NIKOSULFURON
60 g/l



KOMPLEKSOWY

wewnętrzny adiuwant, czyli substancja pomocnicza, wzmacnia działanie środka

EFEKTYWNY

idealny partner do sporządzania mieszanin opryskowych

EKONOMICZNY

niska dawka, wysoka skuteczność działania

PRZYSWAJALNY

forma płynna ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 1,0 l/ha	1	po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-05)
			od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 0,5-0,7 l/ha	1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)

JUZAN[®]

EXTRA 100 SC

ZAWARTOŚĆ MA ZNACZENIE



PODWÓJNA SIŁA DZIAŁANIA
pobierany przez liście i korzenie
błyskawicznie hamuje wzrost
chwastów

UNIWERSALNY
świetny partner do mieszanin
opryskowych

EKONOMICZNY
dobór dawki do stanu
zachwaszczenia

NIEZAWODNY
płynna forma ułatwia aplikację środka

UPRAWA	ZALECANA DAWKA	LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 KUKURYDZA	 0,75 - 1,0 l/ha	1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
 KUKURYDZA CUKROWA KUKURYDZA PĘKAJĄCA		1	w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)

LEPTOSAR[®]

200 SL

SZKODNIKI NIE MAJĄ SZANS



★ Środek jest przeznaczony do nalistnego zwalczania szkodników ssących i gryzących.

★ Znana substancja z grupy neonikotynoidów - acetamipryd to gwarancja skuteczności.

★ **LEPTOSAR[®]** zachowuje wysoką skuteczność działania na stadia larwalne jak i owady dorosłe.

★ Dzięki formulacji SL preparat szybko przenika przez warstwę komórek roślinnych, docierając do wszystkich tkanek. Ponadto forma koncentratu SL zapewnia odpowiednią jakość i stabilność cieczy roboczej.

★ Produkt należy do środków ochrony roślin wpisanych do użycia w **Integrowanej Produkcji**




Ogranicza populację **omacnicy prosowianki** w kukurydzy:
Zalecane dawkovanie: **0,3 l/ha**
Stosowanie od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłoskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej (BBCH 51-61)



Zwalcza **mszyce i zmieniki** w uprawie kukurydzy pękającej:
Zalecane dawkovanie: **0,2 - 0,3 l/ha**
Stosowanie od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości młecznej (BBCH 51-75)

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY



Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego areалу



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym