

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

TECHNOLOGIE OCHRONY RZEPAKU



Better Farming
Better Future

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

TECHNOLOGIE OCHRONY RZEPAKU

Spis treści

HERBICYDY:

LABRADOR® EXTRA 50 EC	2
FAWORYT® 300 SL	3

FUNGICYDY I REGULATORY WZROSTU:

DOVO® 375 SC	4
SIARKOL® 800 SC	5
AZOKSAR® SUPER 250 SC	6
ZAROLIS®	7

INSEKTYCYDY:

LEPTOSAR® 200 SL	8
------------------	---

Program ochrony rzepaku ozimego

Program ochrony rzepaku	9
Program ochrony rzepaku - sekwencyjny	11



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

LABRADOR®

EXTRA 50 EC



CHIZALOFOP-P
ETYLU
50 g/l

SKUTECZNY
w zwalczaniu chwastów
jednoliściennych

EFEKTYWNY
niszczy nadziemne i podziemne
części chwastów

ELASTYCZNY
możliwość doboru dawki oraz
zastosowania od wczesnych
faz rozwojowych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
RZEPAK OZIMY	0,75-2 l/ha	1	Od BBCH 12 jesienią od pierwszej pary liści rzepaku
			Do BBCH 50 wiosną po ruszeniu wegetacji, do fazy „zielonego pąka”
RZEPAK JARY			BBCH 12 - 50 od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju fazy „zielonego pąka”

FAWORYT

300 SL



BEZKONKURENCYJNIE

zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwoną

BEZWZGLĘDNIE

niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety

SKUTECZNIE

zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów

WYGODNY

świetne uzupełnienie ochrony herbicydowej oraz komponent do mieszanin opryskowych

BEZPIECZNY


dla upraw następczych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 RZEPAK OZIMY	0,3-0,4 l/ha	1	Wiosną od ruszenia wegetacji, do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

DOVVO®

375 SC



KLUCZOWY

zastosowany jesienią oraz wiosną zwalcza najważniejsze choroby rzepaku

KOMPLETNY

dwie uzupełniające się substancje systemiczne: panklobutrazol i difenokonazol

KONKRETNY

reguluje pokrój roślin, ogranicza starty w plonie związane z wyleganiem roślin

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY RZEPAK OZIMY	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), czern krzyżowych	0,3 l/ha	BBCH 14 – 16 jesienią – w fazie 4–6 liści. Środek stosować zapobiegawczo
	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)	0,35 l/ha	BBCH 31 – 55 wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie. Stosować zapobiegawczo i interwencyjnie
 RZEPAK JARY RZEPAK JARY	Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu, Sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, Biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza		

DOVVO® 375 SC ZAREJESTROWANY JEST TEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH MAŁOOBZAROWYCH: LEN, MAK, GORCZYCE

SIARKOL[®]

800 SC



ZAPOBIEGAWCZY

chroni plantację przed infekcją mączniaka prawdziwego

PRZYSTĘPNY

rejestracja w 58 uprawach roślin uprawnych, a także zalesieniach i odnowieniach

PRAKTYCZNY

możliwość wielokrotnego użycia w sezonie


EKOLOGICZNY

zakwalifikowany w rolnictwie ekologicznym

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L

AZOKSAR[®]

SUPER 250 SC



UNIWERSALNY

zarejestrowany w uprawach polowych, pod osłoną a także małoobszarowych

WIELOKIERUNKOWY

doskonały partner w różnych programach ochrony

EKONOMICZNY

zmienność dawkowania obniża koszt aplikacji zachowując przy tym wysoką skuteczność

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK JARY	mączniak prawdziwy	 3,0 l/ha	BBCH 12 – 29 zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	 0,8 l/ha	BBCH 60 – 69 w fazie kwitnienia rzepaku

AZOKSAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH: ZBOŻA OZIME I JARE, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

ZAROLIS®



- SKUTECZNY**
chroni rzepak przed chorobami grzybowymi
- KOMPLETNY**
systemiczny preparat, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
- NIEZAWODNY**
skuteczność substancji potwierdzona wieloletnią praktyką rolniczą


Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPÉKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓ		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych	 1,0 l/ha	BBCH 65 – 69 od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia
 RZEPAK JARY	czerń krzyżowych, szara pleśń		

LEPTOSAR®

200 SL

SZKODNIKI NIE MAJĄ SZANS



- SKUTECZNY**
szkodniki przestają żerować tuż po zastosowaniu preparatu chroniąc rośliny przez wiele dni
- UNIWERSALNY**
szeroka rejestracja w blisko 50 uprawach polowych, pod osłoną oraz małopowierzchniowych. Krótki okres karencji
- KOMPLEKSOWY**
zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych zapewnia **EFEKT LONG ACTION+**


Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	 0,2 - 0,3 l/ha	BBCH 30 – 59 od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania
	słodysek rzepakowy		BBCH 50 – 59 od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania
	chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik		BBCH 59 – 71 od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWIE KUKURYDZY, ZBOŻACH, WARZYWACH I SADACH

JESIEŃ

WIOSNA



BBCH

PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

SEKWENCYJNE ZABIEGI NA „PŁATEK” = ZABIEGI 1) + 2)

QEMETICA®
Agricultural Solutions

JESIEŃ

WIOSNA

DOVVO®
375 SC

14 16

DOVVO®
375 SC

31

55

1) AZOKSAR® + DIFENOKONAZOL
SUPER 250 SC

60

LEPTOSAR®
200 SL

30

51

71

FAWORYT
300 SL

20

50

2) ZAROLIS®

69

LABRADOR®
EXTRA 50 EC

12

50

BBCH

00

przed
siewem

10

siew

12

rozwój liści
(formowanie rozety)

19

20

rozwój
pędów bocznych

21

29

30

wzrost pędu
głównego

39

51

zielony
pąk

59

żółty
pąk

60

kwitnienie

69

71

rozwój
łuszczyn

79

80

dojrzwanie,
zbiory

99

ściernisko



Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego arealu



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Tel: +48 17 24 07 111

e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:

www.qemetica-agro.pl

