

QEMETICA

Agricultural Solutions
Poland

WIOSENNA OCHRONA RZEPAKU



Śledź nas na:



www.qemetica-agro.pl

Better Farming
Better Future

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

WIOSENNA OCHRONA RZEPAKU

Spis treści

Środki ochrony rzepaku ozimego

LABRADOR® EXTRA 50 EC	2
FAWORYT® 300 SL	3
DOVVO® 375 SC	4
LEPTOSAR® 200 SL	5
ZAROLIS®	6
AZOKSAR® SUPER 250 SC	7
HALVETIC®	8

Program ochrony rzepaku ozimego ... 9



LABRADOR® EXTRA 50 EC

SYSTEMICZNIE DO CELU



CHIZALOFOP-P
ETYLU
50 g/l

SKUTECZNY
w zwalczaniu chwastów
jednoliściennych

EFEKTYWNY
niszczy nadziemne i podziemne
części chwastów

ELASTYCZNY
możliwość doboru dawki oraz
zastosowania od wczesnych
faz rozwojowych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
  RZEPAK OZIMY	0,75-2 l/ha	1	Od BBCH 12 jesienią od pierwszej pary liści rzepaku
			Do BBCH 50 wiosną po ruszeniu wegetacji, do fazy „zielonego pąka”
 RZEPAK JARY			BBCH 12 - 50 od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju fazy „zielonego pąka”

FAWORYT®

300 SL

TO KOMFORT TWOICH UPRAW



CHLOPYRALID
300 g/l

BEZKONKURENCYJNIE

zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwoną

BEZWZGLĘDNIE

niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety

SKUTECZNIE

zwalcza części nadziemne i podziemne chwastów

WYGODNY

świetne uzupełnienie ochrony herbicydowej oraz komponent do mieszanin opryskowych

BEZPIECZNY

dla upraw następczych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA
 RZEPAK OZIMY	0,3-0,4 l/ha	1	Wiosną od ruszenia wegetacji, do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

DOVVO®

375 SC

PEWNY PŁON, WYRÓWNANA UPRAWA

DIFENOKONAZOL
250 g/l
PAKLOBUTRAZOL
125 g/l



KLUCZOWY

zastosowany jesienią oraz wiosną zwalcza najważniejsze choroby rzepaku

KOMPLETNY

dwie uzupełniające się substancje systemiczne: paklobutrazol i difenokonazol

KONKRETNY

reguluje pokrój roślin, ogranicza starty w plonie związane z wyleganiem roślin

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), czerń krzyżowych	0,3 l/ha	14 – 16 jesienią – w fazie 4-6 liści
	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu; sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)	0,35 l/ha	31 – 55 wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie

DOVVO® 375 SC ZAREJESTROWANY JEST TEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH: LEN, MAK, GORCZYCE

LEPTOSAR®

200 SL

SZKODNIKI NIE MAJĄ SZANS



ACETAMIPRYD
200 g/l

SKUTECZNY

szkodniki przestają żerować już po zastosowaniu preparatu chroniąc rośliny przez wiele dni

UNIwersalny

szeroka rejestracja w blisko 50 uprawach polowych, pod osłoną oraz małoobszarowych. Krótki okres karencji

KOMPLEKSOWY

zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych zapewnia **EFEKT LONG ACTION+**

Dostępny w opakowaniach: 250ml, 1L, 5L

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,2 - 0,3 l/ha	30 – 59 od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania
	słodysek rzepakowy	0,15 - 0,3 l/ha	50 – 59 od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania
	chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik		59 – 71 od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWIE
KUKURYDZY, ZBOŻACH, WARZYWACH I SADACH

ZAROLIS®

KOMPLETNY I KONKRETNY W DZIAŁANIU



PROTIKONAZOL
125 g/l
TEBUKONAZOL
125 g/l

SKUTECZNY

chroni rzepak przed chorobami grzybowymi

KOMPLETNY

systemiczny preparat, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego

NIEZAWODNY

skuteczność substancji potwierdzona wieloletnią praktyką rolniczą

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	Spektrum zwalczanych chorób		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych	1,0 l/ha	65 – 69 od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia
 RZEPAK JARY	czerń krzyżowych, szara pleśń		

AZOKSAR[®]

SUPER 250 SC

WSZECHSTRONNY W KAŻDYM CALU



AZOKSYSTROBINA
250 g/l

UNIWERSALNY

zarejestrowany w uprawach polowych, pod osłoną a także małoobszarowych

WIELOKIERUNKOWY

doskonały partner w różnych programach ochrony

EKONOMICZNY

zmienność dawkowania obniża koszt aplikacji zachowując przy tym wysoką skuteczność

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROŃ		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 RZEPAK OZIMY	czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	 0,8 l/ha	60 – 69 w fazie kwitnienia rzepaku

AZOKSAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH:
ZBOŻA OZIME I JARE, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

HALVETIC[®]

BGT[®]
Better Glyphosate
Technology

ZAAWANSOWANA FORMUŁA INTELIGENTNE DZIAŁANIE

- Idealnie dostosowany na potrzeby Systemów Zrównoważonego Rolnictwa (uprawa uproszczona lub konserwująca)
- Łatwy w użyciu dzięki wbudowanemu systemowi adiuwantów, zapewniający pełną kontrolę nad chwastami
- Brak ograniczeń w doborze upraw następczych

www.halvetic.com

Technologia BGT zapewnia dwa razy większą wydajność produktu - potwierdzono na podstawie badań rejestracyjnych względem standardowych produktów dostępnych w sprzedaży.

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L, 1000L




UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH – ŚCIERNISKA	bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, kostrzewa czerwona, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyčajna, psianka czarna, samosiwy zbóż, starzec zwyczajny, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa, babka lancetowata	 2,5-4,0 l/ha	po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

HALVETIC[®] ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWIE KUKURYDZY, UPRAWACH
SADOWNICZYCH, WARZYWNYCH ORAZ TERENACH NIEUŻYTKOWANYCH ROLNICZO.

PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland



BBCH



JESIEŃ

WIOSNA

Na QEMETICĘ zawsze możesz liczyć!



KALKULATOR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OBLICZY DLA TWOJEJ UPRAWY M.IN.:

- potrzebną ilość produktu oraz wody
- powierzchnię, jaką opryskasz przy jednym napełnieniu opryskiwacza
- ilość wymaganych napełnień opryskiwacza dla całego areалу



 **SKANUJ KOD QR**
i przejdź do kalkulatora

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym