

KATALOG PRODUKTÓW

QEMETICA®
Agricultural Solutions

Better Farming
Better Future

1/2026





SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
 ul. Chemików 1
 37-310 Nowa Sarzyna
 Tel.: +48 17 24 07 111
 e-mail: agro.pl@qemetica.com
www.qemetica-agro.pl

O FIRMIE

QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. **- wspieramy rolnictwo przyszłości!**

Zlokalizowana w województwie podkarpackim Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Qemetiki-filarem biznesu AGRO, czyli ofertą nowoczesnych rozwiązań dla współczesnego rolnictwa. Obecnie spółka jest największym polskim producentem środków ochrony roślin z szybko rosnącą sprzedażą zagraniczną. Poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii.

Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin.

Qemetica Agricultural Solutions Poland dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym oraz laboratorium z prestiżowym certyfikatem GLP („Good Laboratory Practice”, pol. „Dobra Praktyka Laboratoryjna”).

Pełny asortyment obszaru AGRO Qemetiki obejmuje ponad 150 pozycji produktowych (herbicydów, fungicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu i zapraw nasiennych). Jedną z największych innowacji ostatnich lat oferowanych przez biznes Agro jest Halvetic - bazujący na opatentowanej technologii BGT o skuteczności potwierdzonej przez 800 badań na czterech kontynentach. Halvetic pozwala na zachowanie skuteczności przy jednoczesnym ograniczeniu dawki substancji aktywnej wpisując się w trend zrównoważonego rolnictwa.

Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, DOVVO® 375 SC, LABRADOR® EXTRA 50 EC, TEZOSAR® EXTRA BOX.

QEMETICA
Agricultural Solutions Poland S.A.
 posiada certyfikaty:



Więcej informacji znajduje się na stronie www.qemetica-agro.pl



SPIS TREŚCI

6	HERBICYDY
16	FUNGICYDY
22	INSEKTYCYDY
26	REGULATORY WZROSTU
27	ZAPRAWY NASIENNE
27	PAKIETY PRODUKTÓW
29	PROGRAMY OCHRONY:
	• ZBOŻA
	• RZEPAK
	• KUKURYDZA
	• SADY KRZEWY: JABŁOŃ
	• BURAK CUKROWY

Publikacja ma charakter informacyjny i zawiera tylko wybrane fragmenty etykiet i instrukcji stosowania poszczególnych produktów umożliwiające użytkownikowi identyfikację nazw środków oraz zapoznanie się z ich składem i ogólnymi zasadami ich aplikacji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Możliwość kopiowania fragmentów lub całości albumu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wydawcy, autorów tekstów i właścicieli zdjęć.

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
CHWASTOX TURBO® 340 SL	MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l	kukurydza	gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	1,5	stosować w fazie 1-5 liścia kukurydzy (BBCH 11-15)
			chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	Chwastox Turbo® 340 SL 1-1,25 + Nikosar® 060 OD 0,7	
			gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne Wyższa dawka dodatkowo zwalcza marunę bezwoną, szarłat szorstki, rdestówkę powojową	0,75-1,0	
		jęczmień jary, owies, pszenica jara, pszenżyto jare	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia	2,5	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
		pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy		Chwastox Turbo® 340 SL 2,5 + Ambasador® 75 WG 0,02	
CHWASTOX TURBO® 340 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l	plantacje nasienne traw	gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	2,5	stosować w fazie 1-5 liścia rośliny uprawnej (BBCH 11-15)
		miskant		2,0	
		kukurydza pękająca, sorgo zwiste, proso zwyczajne	gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	1,5	System dawek dzielonych: <u>Pierwszy zabieg:</u> zastosować w fazie 1-2 liści kukurydzy (BBCH 11-12) <u>Drugi zabieg:</u> zastosować do końca fazy 5 liścia właściwego (BBCH < 15)
			gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne	0,75-1,0	
			Wyższa dawka dodatkowo zwalcza: marunę bezwoną, rdestówkę powojową, szarłat szorstki		
		tytoń	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia	2,5	stosować po kwitnieniu w trakcie sezonu wegetacyjnego (BBCH 69-99)
		rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie ozdobne			
		odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych, rośliny szkółkarskie leśne, plantacje drzewek bożonarodzeniowych		2	stosować w trakcie sezonu wegetacyjnego (BBCH 00-99).
		wierzba sp. uprawiana na cele energetyczne, wierzba sp. uprawiana na cele wikliniarskie, topola uprawiana na cele energetyczne			

CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL	MCPA 200 g/l, mekoprop-P 150 g/l, dikamba 40 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	2,0	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
		jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenżyto jare	dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	1,5	
		trawniki, boiska sportowe, pola golfowe	babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, konieczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny	2,0	
CHWASTOX EXTRA® 300 SL	MCPA 300 g/l	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślak polny, ostróżeczka polna, poziomnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny	3,0	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
		jabłoń	bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata	Chwastox Extra® 300 SL 2,5 + Agrosar® 360 SL 5,0	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		miskant		3,0	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
CHWASTOX EXTRA® 300 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)		plantacje nasienne traw			
CHWASTOX® COMPLEX 260 EW	MCPA 200 g/l, chlopyralid 20 g/l, fluoksypyr 40 g/l	pszenica ozima	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyka wąskolistna	2,0-3,0	od początku fazy krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 21-32)
		trawniki, boiska sportowe, pola golfowe	babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jastrzębiec kosmaczek, konieczyna biała, konieczyna drobnogłównkowa, konieczyna łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona, prosienniczak szorstki, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna	2,5	od wiosny do wczesnej jesieni
			babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, konieczyna biała, konieczyna drobnogłównkowa, konieczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienniczak szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna	3,5	

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
CHWASTOX® 750 SL	MCPA 750 g/l	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies	bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziomnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polne	0,75	wiosną, od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
		jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto		1	od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty
		jabłoń			
AGROSAR® 360 SL	glifosat 360 g/l	ścierniska (pszenica ozima, rzepak ozimy)	fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tasznik pospolity	4,0	po zbiorze rośliny uprawnej, przed rozpoczęciem upraw późniwnych
		jabłoń	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyzna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępowia zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, mak polny, rdestówka powojowata, starzec zwyczajny, fiołek polny, bodziszek drobny, wierzbownica gruczołowata	3,0-8,0	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
				Chwastox Extra® 300 SL 2,5 + Agrosar® 360 SL 5,0	
		ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyzna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępowia zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna	5,0-7,5	od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów
		torowiska kolejowe		7,5	od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich intensywnego wzrostu

AGROSAR® 360 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	glifosat 360 g/l	agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyzna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępowia zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, mak polny, rdestówka powojowata, starzec zwyczajny, fiołek polny, bodziszek drobny, wierzbownica gruczołowata	3,0-8,0	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		szkółki leśne – sadzonki drzew iglastych i liściastych	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdestówka powojowata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	2,0-3,0	w celu zwalczania chwastów zielonych, krzewiastych i drzewiastych; środek stosować do wysokości metra sadzonki
		odnowienia, zalesienia – sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdestówka powojowata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	2,0-3,0	w celu zwalczania chwastów zielonych oraz niezdrewniałych odrosli drzew i krzewów; środek stosować do wysokości metra drzewka, w przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego
HALVETIC®	glifosat w formie soli izopropylowymi nowej 180 g/l	kukurydza	chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	1,5-3,0	po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00–09)
		ścierniska (rozpoczęciem upraw późniwnych)	bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa	2,5-4,0	po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty
		tereny nieużytkowane rolniczo	babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna	4,0-6,0	stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu
		jabłoni i grusza	chwasty wieloletnie	HALVETIC® 2,0 + Chwastox® 750 SL 0,5 lub HALVETIC® 4,0 + Chwastox® 750 SL 1,0	w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
HALVETIC® (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	glifosat w formie soli izopropyloaminy 180 g/l	cukinia, patison, kabaczek	chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	1,5-3,0	do 3 dni przed siewem lub przed posadzeniem rośliny uprawnej (BBCH 00)
		por, szczypiorek, cebula siedmiolatka			
		kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, rzeżucha ogrodowa			
		sałata			
		cebula, cebula siedmiolatka, ozosnek, szalotka			po siewie a przed wschodami lub przed posadzeniem rośliny uprawnej (BBCH 00-03)
		kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, sorgo, proso			
		seler korzeniowy, chrzan pospolity, topinambur, cykoria korzeniowa, cykoria салатowa			przed siewem lub po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09)
		pomidor, oberżyna			po siewie a przed wschodami lub przed posadzeniem rośliny uprawnej (BBCH 00-09)
		marchew, pietruszka, pasternak, salsefia, brukiew, rzodkiew japońska, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzepa, burak ćwikłowy			po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09)
		cukinia			w trakcie sezonu wegetacyjnego (BBCH 00-99)
		rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne			
		wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, nektarynka, jabłoń płonka (dzika), grusza azjatycka, pigwa, nieszpuka zwyczajna, winorośl	babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna	4,0-6,0	na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają, lecz są zamknięte w jasnobrzozowych łuskach, do fazy początku dojrzewania, gdy owoce są już wybarwione (BBCH 51-81)
		kasztan jadalny, leszczyna pospolita, orzech włoski			w trakcie sezonu wegetacyjnego (BBCH 00-99)
		odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych, plantacje drzewek bożonarodzeniowych			
		tytoń			przed posadzeniem rośliny uprawnej
		wierzba wiciowa (wierzba energetyczna), wierzba purpurowa (wiklina)			

AMBASADOR® 75 WG	amidosulfuron 750 g/kg	pszenica ozima	przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, poziwien szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku	0,02-0,04 lub Chwastox Turbo® 340SL 2,5 + Ambassador® 75WG 0,01-0,02	od początku fazy krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 21-32)
EVRITELL® 162 OD	dikamba 110 g/l nikosulfuron 40 g/l tifensulfuron metylowy 12 g/l	Kukurydza uprawiana na ziarno, kiszonkę i bioetanol	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne	0,75 - 1,0	stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)
FAWORYT® 300 SL	chlorypyralid 300 g/l	rzepak ozimy	chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny	0,3-0,4	od ruszenia wegetacji do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach (BBCH 10-50)
		pszenica ozima		0,3	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29)
		burak cukrowy			od 2 do 4 liści (BBCH 12-14)
FENUXAR® 69 EW SARFENOX® 69 EW	fenoksaprop-P-etylu 69 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime	miotła zbożowa	1,0-1,2	na wiosnę, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3 kolanka (BBCH 22-33)
FENUXAR® 69 EW + CHWASTOX TURBO® 340 SL	fenoksaprop-P-etylu 69 g/l + MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l	jęczmień jary, pszenica jara	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	Fenuxar® 69 EW 1,2 + Ambassador® 75 WG 0,02	od początku fazy krzewienia do końca fazy 1 kolanka (BBCH 20-31)
HUKKATA® 500 SC HUKKATA® QS 500 SC ETAMOR® 500 SC	diflufenikan 500 g/l	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	chaber bławatek, bodziszek drobny, fiołek polny, miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity	0,2-0,375	stosować jesienią bezpośrednio po siewie zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29)
KRUM® 800 MAHAK® 800 KRUM® QS 800 SARBY® 800	prosulfokarb 800 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	miotła zbożowa, komosa biała, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczokowy, przetacznik perski, przytulia czepna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna	3,0	po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13)
		ziemniak		3,0-5,0	po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13)
KRUM® 800 MAHAK® 800 KRUM® QS 800 SARBY® 800 (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	prosulfokarb 800 g/l	żyto jare, proso zwyczajne	miotła zbożowa, komosa biała, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczokowy, przetacznik perski, przytulia czepna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna	3,0	po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
KRUM® 800 MAHAK® 800 KRUM® QS 800 SARBY® 800 (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	prosulfokarb 800 g/l	cebula z siewu	miotła zbożowa, komosa biała, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna	3,0-4,0	po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14)
				2,0	w fazie 1–2 liści cebuli oraz w fazie 4 liści cebuli (BBCH 11-12 + 14)
		cebula z rozsady, cebula z dymki		3,0-4,0	w fazie 1–4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść, po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki (BBCH 11-14)
		por z siewu			w fazie 2–4 liści (BBCH 12-14)
		por z rozsady		3,0-5,0	w fazie 2–4 liści po 7–14 dniach po posadzeniu rozsady (BBCH 12-14)
		czosnek		3,0-4,0	po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1–2 liści (BBCH 11-12)
		marchew, pietruszka korzeniowa)			w fazie 2–4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14)
				2,0-3,0	w fazie 2–3 liści marchwi oraz w fazie 4 liści marchwi (BBCH 12-13 + 14)
		pasternak		2,5-3,0	w fazie 2–4 liści pasternaku (BBCH 12-14)
		seler korzeniowy, seler naciowy		3,0-4,0	w fazie 2–4 liści po 7–14 dniach od posadzenia rozsady (BBCH 12-14)
		chrzan			po sadzeniu i uformowaniu redlin
		bobik, groch pastewny (peluszką), tulin wąsko- listny, tulin żółty, tulin biały, soczewica			do 5 dni po siewie (BBCH 00-02)
		słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawia- ne na nasiona			do 3 dni po siewie (BBCH 00-02)
		rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byli- ny, krzewy ozdobne			przed wschodami roślin uprawnych lub wcześniej po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09)

LABRADOR® EXTRA 50 EC LABRADOR® PRO WIZJER® 50 EC	chizalofop-P-etylu 50 g/l	rzepak ozimy	chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włósnica sina, włósnica zielona	0,75-2,0	jesienią od fazy 2. liścia (od BBCH 12) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy zielonego pąka (do BBCH 50)
		burak cukrowy (plantacje produkcyjne)			od fazy 2. liścia do zakrycia 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35)
		ziemniak			po wschodach ziemniaka; po zakończeniu uprawy międzyrzędowej ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 20-34)
LABRADOR® EXTRA 50 EC LABRADOR® PRO WIZJER® 50 EC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	chizalofop-P-etylu 50 g/l	rzepak jary	chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włósnica sina, włósnica zielona	0,75-2,0	wiosną od fazy 2. liścia do fazy zielonego pąka (BBCH 12-50)
		burak pastewny			od fazy 2. liścia do zakrycia 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35)
		truskawka			od fazy 1. liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wkłęsłą kulę (BBCH 11-59) lub po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 91-97)
		poziomka			po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 91-97)
		cebula uprawiana z siewu			od fazy wyraźnie widocznego 1. liścia właściwego (> 3 cm) do fazy, gdy widocznych jest 9 liści (BBCH 11-19)
		marchew			od fazy rozwiniętego 1. liścia właściwego do fazy, gdy korzeń całkowicie się rozwinie i osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11-49)
		seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna			od fazy 2. liścia właściwego do fazy 5. liścia właściwego (BBCH 12-15)
		kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona			od fazy 4. liścia właściwego do fazy 9. liścia właściwego (BBCH 14-19)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
LABRADOR® EXTRA 50 EC WIZJER® 50 EC LABRADOR® PRO (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	chizalofop- P-etylu 50 g/l	fasola szparagowa	chwastrnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włosnica sina, włosnica zielona	0,75-2,0	od fazy rozwiniętego 3. liścia właściwego (pierwszy liść trójlistkowy) do fazy widocznego pierwszego pędu bocznego (BBCH 13-21)
		słonecznik zwyczajny			od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 12-16)
		len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno			od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10-16)
		gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, mak lekarski, rzepik ozimy			od fazy pierwszej pary liści do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 10-39)
		pomidor, bakłażan			od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 14-29)
					od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51)
		soja			od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59)
		bób, fasola zwyczajna, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny zwyczajny, groch zielony łuskowy, soczewica jadalna, ciecierzyca pospolita, lędzwan siewny			od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59)
		bobik, groch siewny pastewny (peluszką), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny			od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49)
		komonica biała, komonica błotna, komonica zwyczajna, esparceta siewna – w uprawach nie przeznaczonych do produkcji pasz			od fazy rozwiniętego drugiego liścia w fazach BCH 12-39 lub BBCH 50-93
		pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia, skorzonera			od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12-93)
		rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie ozdobne			
		odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych, rośliny szkółkarskie leśne, plantacje drzewek bożonarodzeniowych			
		wierzba sp. uprawiana na cele energetyczne, wierzba sp. uprawiana na cele wikli- niarskie, topola uprawiana na cele energetyczne			

OPAL® 500 SC OPAL® QS 500 SC GIVEH® 500 SC ZŁOTOSAR® 500 SC	chlorotoluron 500 g/l	pszenica ozima	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	2	jesienią od fazy 3-4 liści właściwych pszenicy ozimej do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)
				2,5	wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, od początku fazy krzewienia pszenicy ozimej, do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 23-30)
SAROKSYPYR® 250 EC	fluoksypyr 250 g/l	pszenica ozima	gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia, przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity	0,5-0,8	od początku ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 31-37)
TOSCANA® TOP 75 WG	tribenuron metylowy 750 g/kg	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna	0,02	jesienią od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29)
				0,025	wiosną od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego (BBCH 13-39)
		jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare		0,02	
JUZAN® EXTRA 100 SC JUZAN® MX 100 SC	mezotrion 100 g/l	kukurydza, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca	fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna	0,75	w fazie od 2. do 8. liści właściwych (BBCH 12-18)
			fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, żółticia drobnokwiatowa	1,0	
NIKOSAR® 060 OD KORNIC® 060 OD	nikosulfuron 60 g/l	kukurydza	chwastrnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	0,5	w fazie od 2. do 8. liści właściwych (BBCH 12-18)
			chwastrnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	0,7	
			chwastrnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, psianka czarna, rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	Chwastox Turbo® 340 SL 1,0 – 1,25 + Nikosar® 060 OD 0,7	stosować w fazie 1-5 liścia kukurydzy (BBCH 11-15)
			fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, tasznik pospolity	1,0	po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-05) lub od fazy 2. do 6. liści (BBCH 12-16)

*szerokość spektrum zwalczanych chwastów dla dawki maksymalnej z podanego zakresu dawkowania

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
AZOKSAR® SUPER 250 SC STARJET® SUPER 250 SC AZOKSAR® QS 250 SC	azoksy-strobina 250 g/l	pszenica ozima, pszenica jara	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów	0,8	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia (BBCH 30-59)
		jęczmień ozimy, jęczmień jary	rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)		
		pszenżyto ozime	septorioza plew, rdza brunatna		
		żyto ozime	rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż		
		rzepak ozimy	czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa		
		ziemniak	rizoktonioza ziemniaka	2,0-3,0	zapobiegawczo, interwencyjnie środek stosować do opryskiwania pasowego gleby (BBCH 00)
			alternarioza ziemniaka	0,5	zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85)
		cebula, czosnek, szalotka	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki).	0,8	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48)
		fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72)
		groch uprawiany na zielone nasiona	askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)
		kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągną typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49)
		marchew	alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych		zapobiegawczo, interwencyjnie fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49)
		sałata (uprawa w polu)	mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49)
		pomidor (uprawa w polu)	alternarioza pomidora		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągną pełną dojrzałość) (BBCH 21-89)
		por	rdza pora, alternarioza pora		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48)
		seler korzeniowy	septorioza selera	0,8	od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49)
		papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki	0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 l wody)	od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągną pełną dojrzałość) (BBCH 16-89)

AZOKSAR® SUPER 250 SC STARJET® SUPER 250 SC AZOKSAR® QS 250 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	azoksy- strobina 250 g/l	sałata (uprawa pod osłonami)	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 l wody)	od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49)
		chmiel	mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym).	1,6	zapobiegawczo, interwencyjnie od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55)
		cebula, czosnek, szalotka	rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i>	0,8	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48)
		fasola szparagowa	rdza fasoli		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72)
		kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior	bielik krzyżowych		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągną typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49)
		pomidor (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy pomidora		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągną pełną dojrzałość) (BBCH 21-89)
		por	fytoftoraza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i>		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48)
		sałata (uprawa w polu i pod osłonami)	rizoktonioza	uprawa w gruncie: 0,8 l/ha uprawa pod osłonami: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 l wody)	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49)
		rośliny zielarskie (uprawa w polu i pod osłonami)	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	uprawa w polu: 0,8 l/ha uprawa pod osłonami: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 l wody)	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49)
		fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu	0,8	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72)
		bób	askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuza-rioza bobiku, rdza bobu		zapobiegawczo, interwencyjnie od momentu wysunięcia się z liści pierwszych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
AZOKSAR® SUPER 250 SC STARJET® SUPER 250 SC AZOKSAR® QS 250 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	azoksy-strobina 250 g/l	ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)	0,8	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72)
		plantacje nasienne bobi-ku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwy-czajnego siewnego, łubin, soczewicy jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)		zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72)
		plantacje nasienne traw, trawy ozdobne	mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistości i rdze liści, zgnilizna twardzikowa		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy strzelania w żdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
DOVVO® 375 SC FORDEH® 375 SC	difeno-konazol 250 g/l paklo-butrazol 125 g/l	rzepak ozimy	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	0,3	zapobiegawczo, interwencyjnie jesienią, w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16)
			regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, sucha zgnili-zna kapustnych (średni poziom zwalczalnia), biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)	0,35	zapobiegawczo, interwencyjnie wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)
DOVVO® 375 SC FORDEH® 375 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	difeno-konazol 250 g/l, paklo-butrazol 125 g/l	rzepak jary, rzepik jary, Inianka siewna jara	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza		
		rzepik ozimy, Inianka siewna ozima	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	0,3	zapobiegawczo, interwencyjnie jesienią, w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16)
			regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza		zapobiegawczo, interwencyjnie wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)
		gorczyca biała, czarna, sarepska	regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyle-ganiu, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzy-żowych, szara pleśń	0,35	zapobiegawczo, interwencyjnie wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego, do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55)
		mak lekarski	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, szara pleśń, mączniak prawdziwy maku, czarna plamistość maku		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 31-55)
		len wykorzystanie na olej, siemię, włókno oraz nasiona	regulacja wzrostu, prze-ciwdziałanie wyleganiu, rdza lnu, mączniak prawdziwy lnu, pasmo lnu, fomoza lnu, alterna-rioza lnu		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych na bocznych rozgałęzieniach (BBCH 31-55)

DOVVO® 375 SC FORDEH® 375 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	difeno-konazol 250 g/l, paklo-butrazol 125 g/l	konopie wykorzystanie na włókno oraz nasiona	regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu, szara pleśń, alternarioza konopi, dziurkowatość liści ko-nopi, septorioza konopi	0,35	zapobiegawczo, interwencyjnie od początku wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych na bocznych rozgałęzieniach (BBCH 31-55)
MECENAS® 60 SL	metkonazol 60 g/l	pszenica ozima	septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów	1,2-1,5	od początku fazy strzelania w żdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
		pszenica jara	fuzarioza kłosów		
		rzepak ozimy	sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza	jesień 0,7-1,0 wiosna 1,0	jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16) wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka (BBCH 30-51)
SIARKOL® 800 SC	siarka 800 g/l	jabłoń	mączniak prawdziwy	6,0-7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		winorośl		2,75-4,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		róża uprawiana w polu i pod osłonami	mączniak prawdziwy róży	3,0	
SIARKOL® 800 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	siarka 800 g/l	burak pastewny, burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy	4,0-7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy pojawienia się pierwszych liści do początku okresu kwitnienia (BBCH 10-61)
		chmiel		3,0-9,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12-71)
		grusza		7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby od fazy początku wzrostu pędu, do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31-60)
		brzoskwinia, morela, śliwa	amerykański mączniak agrestu	3,0-5,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: przed kwitnieniem od fazy pękania pąków liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10-60); po kwitnieniu od fazy rozwoju zalążni do fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-86)
		porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest			zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju pędów do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31-60) oraz od początkowej fazy wzrostu owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-86)
		truskawka			zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie: przed kwitnieniem od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41-60), po kwitnieniu w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców w fazie tworzenia pąków w pachwinach liści do początku zamierania starych liści (BBCH 91-95)
		borówka wysoka, malina			zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem od zakończenia fazy wzrostu pędu do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 41-60), po kwitnieniu w fazie początku wzrostu owocu (BBCH 71) i po zbiorze od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91-95)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
SIARKOL® 800 SC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁO OBSZAROWE)	siarka 800 g/l	ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek uprawiane w gruncie, w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak rzekomy dyniowatych	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte, do pełnej dojrzałości (BBCH 10-89)
		pomidor, bakłażan uprawiane w gruncie, w polu, pod osłonami, w szklarni		1,5-3,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte, do fazy 9 kwiatostanów (BBCH 10-69)
		groch siewny, pastewny, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, łubin, bobik, bób		1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczna jest para łuskowatych liści, do początku fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60)
		kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna		3,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 13-49)
		sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębolistna, rukola, endywia, roszponka, radicchio, cykorja, rukiew uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni			
		marchew, pietruszka	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 2. liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 12-49)
		rzodkiewka uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni		3,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 13-49)
		rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista			zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju liści do końca okresu kwitnienia (BBCH 11-69)
		rośliny zielarskie uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni		3,0-5,0	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu pędu, do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31-60)
		rośliny ozdobne			zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 3. liścia do końca fazy formowania pędów bocznych (BBCH 12-29)
		rzepak jary		3,0	środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju liści do zakończenia okresu kwitnienia (BBCH 10-69)
		rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych		1,2-2,4	

TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW	tebukonazol 250 g/l	pszenica ozima	brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy	0,75-1,25	od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
		rzepak ozimy	czern krzyżowych	0,5-0,75	jesienią, w fazie 4–8 liści (BBCH 14-18)
			sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	0,75-1,0	wiosną, w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-31)
			czern krzyżowych, zgnilizna twardej kłosa	1,0-1,25	od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-65)
ZAROLIS®	protio-konazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l	rzepak ozimy	zgnilizna twardej kłosa, czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych	1,0	zapobiegawczo, interwencyjnie od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
		rzepak jary	czern krzyżowych, szara pleśń		
TOKAMA®	protio-konazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l	pszenica ozima	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż	0,75-1,0	zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia z możliwością przedłużenia do fazy dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji (BBCH 30-59 do 70)
		pszenica jara	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów		
		pszenżyto ozime	rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów		
		pszenżyto jare	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów		
		jęczmień jary	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż		zapobiegawczo, interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
		jęczmień ozimy	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów		
		żyto	rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż		

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane szkodniki	Dawka [l/ha]	Termin aplikacji* [faza BBCH]
LEPTOSAR® 200 SL ACEIRO® 200 SL TAZONIT® 200 SL	acetamipryd 200 g/l	rzepak ozimy	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,2-0,3	od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 30-59)
			ślodyszek rzepakowy	0,15-0,3	po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 50-59)
			chowacz podobnik, przyszczarek kapustnik		od końca fazy pąkowania (żółty pąk) do fazy, gdy 10% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71)
		kukurydza	omacnica prosowianka (średni poziom zwalczania)	0,3	od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciki w kłóskach środkowej części, a kolba wytania się z pochwy liściowej (BBCH 51-61)
LEPTOSAR® 200 SL ACEIRO® 200 SL TAZONIT® 200 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	acetamipryd 200 g/l	rzepak jary, rzepik ozimy, gorczyca: biała, czarna, sarepska	chowacz zterozębny, chowacz brukwiacek	0,2-0,3	od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy pąkowania (pąk zamknięty) (BBCH 20-59)
			ślodyszek rzepakowy	0,15-0,3	od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (pąk zamknięty) (BBCH 50-59)
			chowacz podobnik, przyszczarek kapustnik		od końca fazy pąkowania (pąk zamknięty) do fazy, gdy 10% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71)
		len zwyczajny (uprawiany na włókno i na nasiona)	pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka	0,3	od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego (BBCH 10-14)
			wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec		od fazy początku wydłużania się pędu do fazy początku kwitnienia 10% kwiatów otwartych (BBCH 30-61)
		konopie siewne (uprawa przeznaczona na produkcję włókien i nasion)	pchełka chmielowa	0,2-0,3	od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte i pojawia się pierwsza para liści do fazy, gdy rozwinięta jest czwarta para liści (BBCH 11-14)
			omacnica prosowianka	0,3	środek zastosować w okresie wylęgu larw omacnicy zgodnie z sygnalizacją (czerwiec)
			mszyca konopna i inne gatunki mszyc, wciornastki		od fazy, gdy pęd główny osiąga 90% ostatecznej długości do fazy końca pąkowania (pąk zamknięty) (BBCH 39-59)
		soja (wyłącznie w uprawie na nasiona)	oprzędziki	0,2-0,3	od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 9. węźle (BBCH 11-19)
			zmienik lucernowiec, mszyce	0,3	od fazy początku kwitnienia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65)

LEPTOSAR® 200 SL ACEIRO® 200 SL TAZONIT® 200 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	acetamipryd 200 g/l	mak lekarski (wyłącznie w uprawie na nasiona)	pryszczarek makówkowiak, chowacz makówkowiec	0,15	od początku fazy rozwoju owoców i nasion do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71-89)
		słonecznik zwyczajny (wyłącznie w uprawie na nasiona)	mszyce, zmieniki	0,25	od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy pełni kwitnienia (BBCH 10-65)
		kukurydza pękająca, sorgo zwiśnięte, proso zwyczajne		0,2-0,3	kukurydza, sorgo - od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 51-75); proso - od fazy, gdy szczyt kwiatostanu wytania się z pochwy liścia flagowego do fazy dojrzałości średnio mlecznej (BBCH 51-75)
		dynia zwyczajna (wyłącznie w uprawie na nasiona)	zmieniki	0,2-0,3	od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy otwarty jest pierwszy kwiat na pędzie trzeciego rzędu (BBCH 50-65)
		żyto jare, pszenica twarda, pszenica orkisz, pszenica samopsza, pszenica płaskurka	żółwinek zbożowy	0,2	od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59)
			skrzypionka zbożowa		od fazy widocznego, ale jeszcze nie rozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia (BBCH 37-65)
		pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime	żółwinek zbożowy		od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59)
		pomidor (w uprawie szklarniowej) (w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)	mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki	0,2 (stosowanie środka przy użyciu opryskiwacza plecakowego - stężenie cieczy użytkowej 0,04% - np. 4 ml środka na 10 l wody)	od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20-89)
		oberżyna (syn. bakłazan), papryka (w uprawie szklarniowej) (w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)		0,3 W przypadku stosowania środka przy pomocy opryskiwaczy ręcznych (plecakowych) stężenie cieczy użytkowej powinno wynosić 0,04% (np. 4 ml środka na 10 litrów wody)	
		jabłoń płonka (syn. dzika)	mszyce	0,125	od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)
			owocówka jabłkóweczka		od fazy końca kwitnienia do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 69-74)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane szkodniki	Dawka [l/ha]	Termin aplikacji* [faza BBCH]
LEPTOSAR® 200 SL ACEIRO® 200 SL TAZONIT® 200 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOBSZAROWE)	acetamipryd 200 g/l	jabłoń płonka (syn. dzika)	toczyk grusznowiacek	0,125	od fazy różowego pąka do fazy końca kwitnienia (BBCH 57-69)
			owocnica jabłkowa		w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69)
			pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka		od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73)
		grusza, grusza azjatycka	mszyce		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)
			owocówka jabłkówekczka		od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74)
			śluzownica ciemna		od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 71-87)
			kwiecień grusznowiec		od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)
			pryszczarek grusznowiec		w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79)
			miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 51-71)
		pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna	mszyce		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)
			owocówka jabłkówekczka		od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74)
		wiśnia, czereśnia	mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkówekczka, zwójka różówekczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65)
			licinek tarninaczek		od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)
			kwiecień pestkowiec		od początku fazy białego pąka do pełni fazy kwitnienia (BBCH 57-65)
		brzoskwinia, nektarynka, morela	mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkówekczka, zwójka różówekczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65)

LEPTOSAR® 200 SL ACEIRO® 200 SL TAZONIT® 200 SL (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOBSZAROWE)	acetamipryd 200 g/l	śliwa	mszyce	0,125	od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)
			owocnice śliwowe		pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 69-87)
			owocówka śliwkówekczka		od początkowej fazy rozwoju owoców do początku ich dojrzewania (BBCH 71-81)
			misecznik śliwowy		od fazy zielonego pąka do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 55-59)
			zwójka bukóweczka, zwójka siatkówekczka, zwójka różówekczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście		od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87)
		leszczyna	zwójka bukóweczka, zwójka siatkówekczka, zwójka różówekczka i inne zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużyńka leszczynówka	0,125-0,25	od początku fazy rozwoju kwiatostanów do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65)
			mszyce		
			wciornastek tytoniowiec, mszyce		od początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do fazy pierwszego liścia do fazy, gdy 50% torebek nasiennych jest brązowych (BBCH 40-85)
		tytoń	mszyce	0,125	od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)
		wierzba wiciowa (zw. wierzbą energetyczną), wierza purpurowa (syn. wiklina)	mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak		
		rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych oraz drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach	mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec		od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

*Środki LEPTOSAR® 200 SL/ACEIRO® 200 SL/TAZONIT® 200 SL zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie pojawienia się objawów jego zerwania

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Działanie	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
WINDSAR® 250 EC	trineksapak etylu 250 g/l	pszenica ozima	regulacja wzrostu i rozwoju roślin, skrócenie i usztywnienie źdźbła zbóż – zapobieganie wyleganiu łanu	0,4	od fazy pełni krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39)
				0,3	dawki dzielone: pierwsza dawka w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 29-31) druga dawka w fazie liścia flagowego (BBCH 39)
				Windsar® 250 EC 0,3 + ANTYWYLEGACZ PŁYN 675 SL 1,0	od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33)
		jęczmień ozimy		0,6	od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34)
		żyto ozime		0,3	od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39)
		pszenżyto ozime		0,6	od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32)
		jęczmień jary		0,4	od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32)
		pszenica jara		0,4	od końca fazy krzewienia do końca fazy liścia flagowego (BBCH 29-39)
				0,4	od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34)
		owies siewny		Windsar® 250 EC 0,2 + ANTYWYLEGACZ PŁYN 675 SL 1,0	
		rzepak ozimy		1,5	od fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, ale nadal zamknięte) (BBCH 39-55)
WINDSAR® 250 EC (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	trineksapak etylu 250 g/l	pszenica twarda ozima, pszenica orkisz ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica samopsza ozima	regulacja wzrostu i rozwoju roślin, skrócenie i usztywnienie źdźbła zbóż – zapobieganie wyleganiu łanu	0,4	od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39)
				0,3	Dawki dzielone: <u>Pierwsza dawka:</u> w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 29-31) <u>Druga dawka:</u> w fazie liścia flagowego (BBCH 39)
		pszenica twarda jara, pszenica orkisz jara, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza jara		0,4	od końca fazy krzewienia do końca fazy liścia flagowego (BBCH 29-39)
		żyto jare		0,3	od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39)
		rzepak jary, rzepik ozimy		1,5	od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55)
					w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39)
		plantacje nasienne koniczyny czerwonej		0,8	od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37)
		plantacje nasienne traw			

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [l, kg/100 kg]	Dawka wody [l/100 kg]
ZAPRAWA SARFUN® 025 FS	tritikonazol 25 g/l	pszenica ozima	zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głównia pyłca pszenicy	0,15-0,2	0,4
		pszenżyto ozime	zgorzel siewek, pleśń śniegowa		
		żyto ozime	zgorzel siewek		
		pszenica jara	zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głównia pyłca pszenicy	0,15	
		jęczmień jary	zgorzel siewek, głównia zwarta jęczmienia, głównia pyłca jęczmienia, plamistość siatkowa, pasiastość liści	0,15-0,2	
		owies	zgorzel siewek		
ZAPRAWA SARFUN® 025 FS (UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE)	tritikonazol 25 g/l	pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica samopsza	zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, pleśń śniegowa, głównia pyłca pszenicy	0,15-0,2	0,4
		żyto jare	zgorzel siewek		

PAKIETY PRODUKTÓW


Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
CHWASTOX® DUO BOX	MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l, fenoksaprop-P-etylu 69 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	chwaśtnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	Fenuxar® 69 EW 0,8-1,2 + Chwastox Turbo® 340 SL 2,0-2,5	od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21-29)
TEZOSAR® EXTRA BOX	mezotrion 100 g/l, nikosulfuron 60 g/l, terbutyloazyna (terbutylazyna) 500 g/l	kukurydza	chwaśtnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	Nikosar® 060 OD 0,5-0,7 Tezosar® 500 SC 1,0 Juzan® 100 SC 0,75-1,0	w fazie od 2. do 6. liści kukurydzy (BBCH 12-16)

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!



 **SKANUJ KOD QR**
i porozmawiaj z przedstawicielem rejonowym


PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ - OPTYMALNY




PROGRAM OCHRONY ZBÓŻ - PODSTAWOWY



PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO



PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO



PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

Program
„Czysty
start”

HALVETIC®

00 — 09

Evritell®
162 OD

TEZOSAR®
EXTRABOX

12 — 16

NIKOSAR® + Chwastox
TURBO® 340 SL

12 — 15

LEPTOSAR®
200 SL


51 — 61



BBCH	00	11	12	13-14	15-16	17-18	30-39	51	61	71-79	89	99
	siew	1 liść	2 liście	3-4 liście	5-6 liści	7-8 liści	wydłużanie pędu	rozwój wiechy	kwitnienie	rozwój ziarniaków	dojrzałość pełna	ściernisko

PROGRAM OCHRONY SADÓW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

PROGRAM OCHRONY JABŁONI



PROGRAM OCHRONY BURAKA CUKROWEGO

LABRADOR
EXTRA 50 EC

12

35

FAWORYT
300 SL

12

14



BBCH

00

siew

9

początek
wschodów

10

widoczny
pierwszy liść
właściwy

12

2 liście

15

rozwój liści

19

rozwinętych
9 i więcej liści
właściwych

31

początek
zakrywania
miedzyrzędzi

35

zakryte 50%
miedzyrzędzi

39

koniec zakrywania
miedzyrzędzi

49

dojrzałość
technologiczna

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Tel: +48 17 24 07 111

e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:

www.qemetica-agro.pl

