

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ



Better Farming
Better Future

QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ QΣ

WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ

QEMETICA®
Agricultural Solutions
Poland

Spis treści

Herbicydy

HALVETIC®	2
CHWASTOX TURBO® 340 SL	3
FENUXAR® 69 EW	4
FAWORYT® 300 SL	5
TOSCANA® TOP 75 WG	6

Fungicydy

TOKAMA®	7
AZOKSAR® SUPER 250 SC	8

Regulatory wzrostu

WINDSAR® 250 EC	9
-----------------------	---

Insektycydy

LEPTOSAR® 200 SL	10
------------------------	----

Programy ochrony zbóż

Pełna ochrona T1-T2-T3	11
Podstawowa ochrona T1-T2	13



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Halvetic®

MOC, KTÓRA NALEŻY DO CIEBIE

Chroń swoje uprawy.
Chroń swój plon.

**PODWÓJNA SKUTECZNOŚĆ
W KONTROLI CHWASTÓW**

**MNIEJSZY WPŁYW
NA ŚRODOWISKO**



- Idealnie dostosowany na potrzeby uprawy uproszczonej lub konserwującej
- Łatwy w użyciu dzięki wbudowanemu systemowi adiuwantów
- Brak ograniczeń w doborze upraw następczych

UPRAWA		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH – ŚCIERNISKA	 2,5-4,0 l/ha	po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L, 20L, 1000L

Technologia BGT zapewnia dwa razy większą wydajność produktu - potwierdzono na podstawie badań rejestracyjnych względem standardowych produktów dostępnych w sprzedaży.

Chwastox

TURBO® 340 SL



MCPA
300 g/l
DIKAMBA
40 g/l



- Szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych w tym przytuli i czepnej i komosy białej
- Selektywność dla rośliny uprawnej i brak ograniczeń dla upraw następczych
- Aplikacja we wszystkich gatunkach zbóż
- Ważne ogniwo strategii antyodpornościowej chwastów dwuliściennych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

Fenuxar®

69 EW



FENOKSAPROP-
-P-ETYLU
69 g/l



- Zwalcza uciążliwe chwasty jednoliścienne w uprawie zbóż
- W połączeniu z Chwastox Turbo® 340 SL dopełnia ochronę herbicydową o chwasty dwuliścienne
- Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L



Dostępny w pakiecie
z CHWASTOX
TURBO®

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 JĘCZMIEN JARY, OWIES, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia	2,0 l/ha	21 – 29 od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, JĘCZMIEN OZIMY		2,5 l/ha	

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME	gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	1,0-1,2 l/ha	22 – 33 na wiosnę, gdy widoczne są dwa rozkrzewienia, do końca fazy 3. kolanka
 JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne	FENUXAR® 69 EW 1,0 l/ha + CHWASTOX TURBO® 340 SL 2,0 l/ha	20 – 31 od początku fazy krzewienia do końca fazy 1. kolanka

Faworyt®

300 SL



CHLOPYRALID
300 g/l

- Zwalcza: ostrożeń polny, rumian polny, chabra bławatka, marunę bezwoną. Niszczy intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety
- Powoduje zamieranie części nadziemnych i podziemnych chwastów
- Sprawdzony komponent do mieszanin opryskowych
- Bez ryzyka dla upraw następnych, rozkłada się w glebie w okresie wegetacji

Dostępny w opakowaniach: 250 ml, 1L, 5L

UPRAWA		LICZBA ZABIEGÓW	TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA	0,3-0,4 l/ha	1	21-29 wiosną w fazie krzewienia pszenicy

Toscana®

TOP 75 WG



TRIBENURON
METYLU
750 g/kg

- Zwalcza trudne chwasty w uprawie zbóż
- Szerokie okno aplikacji.
- Możliwość zastosowania wiosną lub jesienią.
- Zastosowanie w zbożach ozimych i jarych

Dostępny w opakowaniach: 20g, 100g, 250g

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHWASTÓW		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna	0,02 kg/ha	13 – 29 jesienią od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia
		0,025 kg/ha	
 JĘCZMIEN JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE		0,02 kg/ha	13 – 39 wiosną od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego

TOKAMA[®]




- Zwalcza i chroni przed chorobami grzybowymi
- Nie wymaga stosowania innych produktów
- Szerokie okno aplikacji w zbożach ozimych i jarych

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEN JARY, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści*	0,75-1,0 l/ha	30 – 59 od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

Azoksar[®]

SUPER 250 SC



- Wykazuje szerokie spektrum działania na choroby grzybowe
- Doskonały partner w drugim zabiegu fungicydowym T2
- Silne działanie zapobiegawcze. Dobrze przemieszcza się w roślinie, co zapewnia ochronę nowych przyrostów

Dostępny w opakowaniach: 1L, 5L, 10L

UPRAWA	SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHOROÓB		TERMIN STOSOWANIA FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów	0,8 l/ha	30 – 59 od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
JĘCZMIEN OZIMY, JĘCZMIEN JARY	rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)		
PSZENŻYTO OZIME	septorioza plew, rdza brunatna		
ŻYTO OZIME	rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż		

AZOKASAR[®] SUPER 250 SC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH: RZEPAK OZIMY, ZIEMNIAK, CEBULA, KAPUSTA ORAZ WIELU INNYCH

Windsar®

250 EC




- Optymalizacja wzrostu – regulacja pokroju roślin pozwala na lepsze wykorzystanie światła i składników pokarmowych
- Szerokie okno aplikacji
- Lepsza odporność na wyleganie – skraca żdźbło, zwiększając stabilność roślin w trudnych warunkach pogodowych

Dostępny w opakowaniach 1L, 5L

Leptosar®

200 SL



- Szkodniki przestają żerować tuż po zastosowaniu chroniąc roślinę przez wiele dni
- Szeroka rejestracja w 50 uprawach: polowych, małoobszarowych i pod osłonami. Krótki okres karencji
- Zwalcza szkodniki w różnych stadiach rozwojowych

Dostępny w opakowaniach: 250 ml, 1L, 5L


UPRAWA	DZIAŁANIE		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
 PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEN OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEN JARY, OWIES SIEWNY, PSZENICA JARA	regulacja wzrostu i rozwoju roślin, skrócenie i usztywnienie żdźbła zbóż – zapobieganie wyleganiu łanu	 0,4 - 0,6 l/ha*	25 – 39* od fazy pełni krzewienia do fazy liścia fagowego*


* w zależności od uprawy, także w dawkach dzielonych

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI		TERMIN STOSOWANIA* FAZA BBCH
ŻYTO JARE, PSZENICA TWARDA, PSZENICA ORKISZ, PSZENICA SAMOPISZA, PSZENICA PŁASKURKA	żółwinek zbożowy skrzypionka zbożowa	 0,2 l/ha	30 – 59 od fazy początku strzelania w żdźbło do fazy zakończenia kłoszenia 37 – 65 od fazy widocznego, ale jeszcze nierozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia
PSZENICA JARA, PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO JARE, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME	żółwinek zbożowy		30 – 59 od fazy początku strzelania w żdźbło do fazy zakończenia kłoszenia

WINDSAR® 250 EC ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ DO STOSOWANIA W UPRAWACH RZEPAKU, A TAKŻE PLANTACJACH NASIENNYCH: TRAW I KONICZYNY CZERWONEJ

LEPTOSAR® 200 SL ZAREJESTROWANY JEST RÓWNIEŻ W UPRAWACH KUKURYDZY, RZEPAKU, WARZYWACH I SADACH





QEMETICA[®]

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: +48 17 24 07 111
e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:
www.qemetica-agro.pl

