

QEMETICA®

Agricultural Solutions
Poland

Evritell®

162 OD

Nowa jakość w ochronie przed chwastami



Nowoczesna formuła do zwalczania chwastów
jedno- i dwuliściennych w kukurydzy

Połączenie 3 substancji aktywnych
z systemem adiuwantów

Elastyczność dawkowania
i terminu stosowania

Better Farming
Better Future






Evritell®

162 OD

Herbicyd selektywny do stosowania nalistnego w ochronie kukurydzy przed chwastami **jednoliściennymi** i **dwuliściennymi**.

Zawartość substancji czynnych:

- tifensulfuron metylowy - 12 g/l
- nikosulfuron - 40 g/l
- dikamba - 110 g/l



JAK STOSOWAĆ EVRITELL®?

- Termin aplikacji: **w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)**
- Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania:
0,75 - 1,0 l/ha

Dawkę należy dostosować do gatunków chwastów, ich fazy rozwojowej i liczebności na polu: Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty

- Zalecana ilość wody: **100 – 300 l/ha**
- Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**





ZALETY STOSOWANIA EVRITELL®

- Zaawansowana funkcjonalność dzięki nowoczesnej formule: **unikalne połączenie 3 substancji aktywnych z systemem adiuwantów**
- **Kompleksowe zwalczanie chwastów** jedno- i dwuliściennych
- **Łatwość** doboru dawki
- **Elastyczność** terminu stosowania

Jakość formulacji **EVRI TEL L**® testowana była w warunkach ekstremalnej twardości wody tj. 1500 ppm. Z tego względu produkt można stosować bez konieczności użycia kondycjonerów

Nie jest również niezbędne zastosowanie dodatkowych preparatów wspomagających z uwagi na **wbudowany układ adiuwantów**, znacząco poprawiających wchłanianie substancji aktywnych.

Zaawansowana formu la cja EVRI TEL L® umożliwia **równomierne pokrycie liści cieczą roboczą oraz zapewnia odpowiednią zwilżalność**, co przekłada się na lepsze utrzymanie kropli oprysku na powierzchni liści zwalczanych chwastów.

UCIAŹLIWE CHWASTY W UPRAWIE KUKURYDZY:

Chwastnica jednostronna
Echinochloa crus-galli



Komosa biała
Chenopodium album



Rdestówka powojowata
Fallopia convolvulus



Maruna bezwonna
Tripleurospermum inodorum



Przytulia czepna
Galium aparine



Fiołek polny
Viola arvensis



Tobołki polne
Thlaspi arvense




Gwiazdnica pospolita
Stellaria media



Bodziszek drobny
Geranium pusillum



Jasnota purpurowa
Lamium purpureum



Ostrożeń polny
Cirsium arvense



Perz właściwy
Elymus repens



Powój polny
Convolvulus arvensis



Psianka czarna
Solanum nigrum



Rumianek pospolity
Matricaria chamomilla



Samosiewy rzepaku
Volunteer Brassica napus



Szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus



Tasznik pospolity
Capsella bursa-pastoris



EFEKTY DZIAŁANIA Evritell®

162 OD

- Uprawa kukurydzy wymaga dużej dbałości o jej prawidłowy wzrost. Podstawowym zagadnieniem jest **skuteczna ochrona herbicydowa** – chwasty znacznie ograniczają poziom plonowania uprawy. Zgodnie z integrowaną ochroną roślin optymalnie **należy zwalczać chwasty w jak najmłodszych fazach rozwojowych**.
- Istotne jest jak najszybsze przeprowadzenie zabiegu ochronnego – dla aplikacji nalistnych - w fazie 2 do 6 liści kukurydzy.



14 dni po zabiegu EVRITELL®

Kontrola

czerwiec 2024, woj. Wielkopolskie, Polska



30 dni po zabiegu EVRITELL®

Kontrola

czerwiec 2024, woj. Wielkopolskie, Polska

- Dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu plonu w różnych obszarach gospodarki, **kukurydza globalnie jest jedną z najważniejszych upraw**. W Polsce również – zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości (po zbożach ozimych), z arealem utrzymującym na poziomie 1,8 mln hektarów (od roku 2022).

- Zachwaszczenie plantacji niechronionej utrudnia zbiór i stanowi „bank nasion” chwastów. W uprawach kukurydzy można wyróżnić ponad 100 gatunków **roślin niepożądanych**, z czego **najbardziej istotnych jest 40**. Na plantacjach powszechnie występują gatunki takie jak komosa biała, chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata, bodziszek drobny czy szarłat szorstki.



Plantacja chroniona EVRITELL®

Plantacja niechroniona - kontrola

czerwiec 2024, woj. Wielkopolskie, Polska



Plantacja chroniona EVRITELL®

Plantacja niechroniona - kontrola

wrzesień 2024, woj. Wielkopolskie, Polska

- Kontrola zachwaszczenia umożliwia kukurydzy optymalny wzrost, wykorzystanie składników pokarmowych z gleby oraz dostęp do światła słonecznego. Dzięki temu możliwe jest **uzyskanie wysokiego plonu zielonej masy i ziarna** kukurydzy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

QEMETICA[®]

Agricultural Solutions
Poland

Śledź nas na:



QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: +48 17 24 07 111
e-mail: agro.pl@qemetica.com

SIĘGAJ PO WIĘCEJ NA:
www.qemetica-agro.pl

