

Leptosar®

200 SL

SZKODNIKI **NIE MAJĄ SZANS**



● **SKUTECZNY**

szkodniki przestają żerować
tuż po zastosowaniu

● **UNIWERSALNY**

szeroka rejestracja w 50
uprawach polowych, pod
osłoną i małoobszarowych

● **KOMPLEKSOWY**

zwalcza szkodniki w różnych
stadiach rozwojowych
zapewnia **EFEKT LONG
ACTION+**



Sięgaj po więcej na
www.qemetica-agro.pl,
lub skanując kod QR



Better Farming
Better Future

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI	 DAWKA	TERMIN APLIKACJI* [faza BBCH]
rzepak ozimy	chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,2 - 0,3 l/ha	od fazy ruszenia wegetacji wiosennej do końca fazy pąkowania (BBCH 30-59);
	słodyszek rzepakowy	0,15 - 0,3 l/ha	od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (BBCH 50-59);
	chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik		od końca fazy pąkowania do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71);
kukurydza	omacnica prosiowianka (średni poziom zwalczania)	0,3 l/ha	od początku fazy rozwoju wiechy do fazy, gdy widoczne są pręciaki w łóskach środkowej części, a kolba wyłania się z pochwy liściowej (BBCH 51-61);
UPRAWY I ZASTOSOWANIA MAŁOOBSZAROWE			
żyto jare, pszenica twarda, pszenica orkisz, pszenica samopsza, pszenica płaskurka	żółwinek zbożowy	0,2 l/ha	od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59);
	skrzypionka zbożowa		od fazy widocznego, ale jeszcze nie rozwiniętego liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia (BBCH 37-65);
pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime	żółwinek zbożowy		od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59);
słonecznik zwyczajny (wyłącznie w uprawie na nasiona)	mszyce, zmieniki	0,25 l/ha	od fazy całkowicie rozwiniętych liści do fazy pełni kwitnienia (BBCH 10-65);
kukurydza pękająca, sorgo zwiste, proso zwyczajne		0,2 - 0,3 l/ha	kukurydza, sorgo - od początku fazy rozwoju wiechy do fazy pełnej dojrzałości młecznej (BBCH 51-75);
dynia zwyczajna (wyłącznie w uprawie na nasiona)		0,2 - 0,3 l/ha	od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy gdy otwarty jest pierwszy kwiat na pędzie trzeciego rzędu (BBCH 50-65);
pomidor (w uprawie szklarniowej)	mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec,	0,2 l/ha (przy użyciu opryskiwacza plecakowego - 0,04%)	od początkowej fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20-89);
	wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki	0,3 l/ha (przy użyciu opryskiwacza plecakowego - 0,04%)	
oberżyna (syn. bakłażan), papryka (w uprawie szklarniowej)			

UPRAWA	ZWALCZANE SZKODNIKI	 DAWKA	TERMIN APLIKACJI* [faza BBCH]
jabłoni płonka (dzika)	mszyce	0,125 l/ha	od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87);
	owocówka jabłkóweczka		od fazy końca kwitnienia do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 69-74);
	owocnica jabłkowa		w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69);
	pryszczarek jabłoniak		od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początkowej fazy opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73);
grusza, grusza azjatycka	mszyce	0,125 l/ha	od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 51-87);
	owocówka jabłkóweczka		od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy, gdzie średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 71-74);
	śluzownica ciemna		od fazy, gdy owoc osiąga wielkość 10 mm do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 71-87);
	kwieciak gruszowiec		od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59);
	pryszczarek gruszowiec		w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79);
	mszyce, zwójki oraz gąsienice innych motyli zjadające liście		od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 51-65);
wiśnia, czereśnia	licinek tarninaczek		od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59);
	kwieciak pestkowiec		od początku fazy białego pąka do pełni fazy kwitnienia (BBCH 57-65);

* Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie pojawienia się objawów jego zerowania.
** Pełen zakres stosowania dostępny na stronie produktu www.qemetica-agro.pl oraz w etykiecie stosowania.

Leptosar®

200 SL

- Środek jest przeznaczony do nalistnego zwalczania szkodników ssących i gryzących.
- Znana substancja z grupy neonikotynoidów - acetamipryd to gwarancja skuteczności.
- **LEPTOSAR®** zachowuje wysoką skuteczność działania na stadia larwalne jak i owady dorosłe.
- Dzięki formulacji SL preparat szybko przenika przez warstwę komórek roślinnych, docierając do wszystkich tkanek. Ponadto forma koncentratu SL zapewnia odpowiednią jakość i stabilność cieczy roboczej.
- Produkt należy do środków ochrony roślin wpisanych do użycia w **Integrowanej Produkcji**



SZEROKIE OKNO APLIKACJI

możliwość stosowania
w różnych fazach
rozwojowych
plantacji



SKUTECZNOŚĆ owadobójcza:



**OMACNICA
PROSOWIANKA**



**OWOCÓWKA
JABŁKÓWECZKA**



MSZYCA



**SŁODYSEK
RZEPAKOWY**



**CHOWACZ
BRUKWIACZEK**



**CHOWACZ
CZTEROZĘBNY**



**CHOWACZ
PODOBNIK**



**PRYSZCZAREK
KAPUSTNIK**

QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.